

Estadística de defunciones

Tras la reciente publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística de la **estadística de defunciones según la causa de muerte** para el ejercicio de 2020, hemos considerado oportuno realizar esta nota informativa con la que pretendemos llamar la atención sobre determinados aspectos con una significativa trascendencia social en nuestra región, además de cuantificar el impacto letal que ha tenido la COVID-19, **responsable del incremento habido en la mortalidad tanto a escala nacional como regional.**


	Nacional	Canarias
Total causas 2020	493.776	16.486
Total causas 2019	418.703	15.756
Variación 19-20 (ABS)	75.073	730
Variación 19-20 (%)	17,93	4,63

El virus COVID-19 identificado ha sido la principal causa de fallecimiento a escala nacional, 60.358 defunciones, un 80,4% de las 75.073 muertes que han supuesto el incremento habido respecto a la anualidad de 2019. Este porcentaje podría aumentar si se consideran los fallecimientos en los que el virus no ha sido identificado pero se sospecha de ser el responsable del óbito.

Esta incidencia se reduce considerablemente en Canarias, donde se han cuantificado 396 defunciones por COVID-19 identificado, un 54,2% del aumento registrado entre ambos ejercicios, cifrado en 730 defunciones adicionales.

	Nacional			Canarias		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
COVID-19. Virus identificado	60.358	32.498	27.860	396	232	164
COVID-19. Virus sospechoso	14.481	6.419	8.062	98	54	44
Total	74.839	38.917	35.922	492	286	208

Principales causas de defunción España 2020



Principales causas de defunción Canarias 2020




Observando las **principales causas de fallecimiento por tramo de edad en las islas** nos preocupa que el **suicidio y las lesiones autoinflingidas constituyan la principal causa de muerte en las personas con edad comprendida entre los 30 y los 44 años**, siendo la segunda causa de muerte para aquellas de 45 a 49 años.

Analizar las circunstancias que rodean estos fallecimientos resulta fundamental a fin de determinar la influencia del contexto social y las condiciones de vida, a parte de la existencia de otras patologías psicológicas que hayan contribuido a tan triste desenlace. Ello invita al debate social y requiere de mecanismos preventivos que desde el ámbito sindical se podrían articular en los centros de trabajo a través de nuestros representantes sindicales.


Destacamos también que el **tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón constituya la primera causa de muerte de las personas con edad comprendida entre los 45 y los 79 años**, probablemente asociado a la falta de hábitos de vida saludables como la práctica deportiva y una alimentación saludable, u otras conductas perjudiciales para la salud como lo es el consumo de tabaco, debiendo reflexionar respecto a la menor fiscalidad asociado a este producto.

En ambos casos la incidencia de estas causas en las islas es notablemente superior al dato que se observa a escala nacional.


Menos de 1 año




De 30 a 39 años




De 1 a 14 años




De 40 a 44 años




de 15 a 29 años




De 45 a 49 años




De 50 a 54 años




De 65 a 69 años




De 55 a 59 años




De 70 a 74 años




De 60 a 64 años



De 75 a 79 años





Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias (G.M.N.), a 17 de noviembre de 2021